

Domperidona		
Nombre	Genérico	Domperidona
	Comercial	Docivin, Domevol, Dompesin, Donegal, dosin, Fasadomp, Gasdol, Idon, Restol, Siligaz.
Grupo terapéutico		
Clasificación		Antieméticos
Condición de dispensación		RM Ambulatoria - Hospitalizados (Blanca)
Uso restringido		No
Presentación	Vía oral	10 mg/1 mL 10mL Fco.
	Parenteral	No Aplica
	Otra	No Aplica
Dosis	Neonatos	Off Label
	Niños	Off Label
	Adultos	30 mg/día repartidos en 1-3 dosis.
Usos/indicación		Nauseas y vómitos, dispepsia, regurgitación.
Vía de administración		VO
Efectos adversos		Ver TABLA 4.5. EFECTOS ADVERSOS. APARATO DIGESTIVO.
Contraindicaciones		IH grave, hipersensibilidad, hemorragia digestiva, obstrucción intestinal, perforación intestinal, prolactinoma.
Farmacocinética	Vida media	7 hrs.
	Unión a proteínas plasmáticas	0,93
	Biodisponibilidad	15 - 20%
	Metabolismo	Hepático
	Excreción	Biliar y renal
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.5. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. APARATO DIGESTIVO.
Mecanismo de acción		Antagonista de receptores de dopamina D2, a nivel periférico y central. Evita la aparición de impulsos emetógenos aferentes y estimula el peristaltismo



		Intestinal.
Administración	Vía oral	Ver tabla Administración Antiparasitarios-Aparato digestivo
	Vía parenteral	No Aplica
Almacenamiento		Mantener entre 20 - 25 °C.
Ajuste de dosis	Función renal	Ver TABLA 1.4. AJUSTE DE DOSIS IR. APARATO DIGESTIVO.
	Función hepática	No
	Otros	No
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Función renal, ECG.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	Si
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		No
Observaciones		No

