

Fentanilo		
Nombre	Genérico	Fentanilo
	Comercial	Dapoval, Durogesic, Fentora, Sinotron
Grupo terapéutico		
Clasificación		Analgésicos Narcóticos y Antagonistas
Condición de dispensación		RM Cheque (Verde)
Uso restringido		No
Presentación	Vía oral	No Aplica
	Parenteral	0,1 mg/2 mL, 0,5 mg/10 mL Amp.
	Otra	No Aplica
Dosis	Neonatos	0,5 - 4 mcg/kg/día
	Niños	1 - 5 mcg/kg/hora
	Adultos	2 - 50 mcg/kg/día
Usos/indicación		Dolor agudo, dolor crónico (oncológico), analgesia complementaria a anestesia, sedante.
Vía de administración		EV, IM, TD
Efectos adversos		Ver TABLA 4.2. EFECTOS ADVERSOS. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC. Analgésicos - Relajantes músculo esquelético.
Contraindicaciones		Intolerancia conocida al fármaco, traumatismo craneoencefálico, presión intracraneal elevada.
Farmacocinética	Vida media	2 - 21 hrs.
	Unión a proteínas plasmáticas	80 - 85%
	Biodisponibilidad	50 - 70%
	Metabolismo	Hepático
	Excreción	Renal
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.2. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC. Analgésicos - Relajantes músculo esquelético.

Mecanismo de acción		Agonista opiáceo, actúa principalmente a través de los receptores mu-opiáceos en el cerebro, la médula espinal y la musculatura lisa.
Administración	Vía oral	No Aplica
	Vía parenteral	Ver TABLA 5.2. ADMINISTRACIÓN PARENTERAL. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC. Analgésicos - Relajantes músculo esquelético.
Almacenamiento		Mantener entre 20 - 25 °C. Proteger de la luz.
Ajuste de dosis	Función renal	Ver TABLA 1.1. AJUSTE DE DOSIS IR. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC.
	Función hepática	Ver TABLA 2.1. AJUSTE DE DOSIS IH. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC.
	Otros	No
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Presión sanguínea, frecuencia cardíaca, función respiratoria, saturación de oxígeno, alivio del dolor.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	No
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		No
Observaciones		60 a 100 veces más potente que morfina. Puede generar tolerancia, dependencia física y psicológica.