

Fludarabina		
Nombre	Genérico	Fludarabina
	Comercial	Fludara, Ludabina
Grupo terapéutico		
Clasificación		Agentes Alquilantes
Condición de dispensación		RM Oncológica (Blanca)
Uso restringido		No
Presentación	Vía oral	No Aplica
	Parenteral	50 mg Fco. Amp.
	Otra	No Aplica
Dosis	Neonatos	Off Label
	Niños	10 - 30,5 mg/m²/día repartidos en 1 dosis.
	Adultos	25 mg/m²/día repartidos en 1 dosis
Usos/indicación		Leucemia linfoide crónica, acondicionamiento de trasplante, rescate en leucemias agudas refractarias.
Vía de administración		EV
Efectos adversos		Ver TABLA 4.15. EFECTOS ADVERSOS. ANTINEOPLÁSICOS. Alquilantes, Antimetabolitos, Alcaloides de la Vinca y Antibióticos.
Contraindicaciones		Hipersensibilidad al p.a., IR, anemia hemolítica descompensada, infección grave.
Farmacocinética	Vida media	20 hrs.
	Unión a proteínas plasmáticas	19 - 29%
	Biodisponibilidad	No Aplica
	Metabolismo	Plasmático
Excreción		Renal
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.15. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. ANTINEOPLÁSICOS. Alquilantes, Antimetabolitos, Alcaloides de la Vinca y Antibióticos.
Mecanismo de acción		Actúa como antimetabolito,



		siendo capaz de inhibir la síntesis de ADN, impidiendo la proliferación celular.
Administración	Vía oral	No Aplica
	Vía parenteral	Ver TABLA 5.15. ADMINISTRACIÓN PARENTERAL. ANTINEOPLÁSICOS. Alquilantes, Antimetabolitos, Alcaloides de la Vinca y Antibióticos.
Almacenamiento		Mantener entre 2 - 25 °C. Proteger de la luz.
Ajuste de dosis	Función renal	Ver TABLA 1.10. AJUSTE DE DOSIS IR. ANTINEOPLÁSICOS.
	Función hepática	No
	Otros	Si
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Recuento sanguíneo completo, recuento de plaquetas, hemoglobina, proteínas hepáticas, electrolitos séricos, albumina, ácido úrico sérico, signos y síntomas de infección y neurotoxicidad.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	No
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		No
Observaciones		No