



Lactulosa		
Nombre	Genérico	Lactulosa
	Comercial	Axant, Duphalac, Lipebin.
Grupo terapéutico		
Clasificación		Estimulantes evacuación intestinal y catárticos
Condición de dispensación		RM Ambulatoria - Hospitalizados (Blanca)
Uso restringido		No
Presentación	Vía oral	65% 1000 mL Fco.
	Parenteral	No Aplica
	Otra	No Aplica
Dosis	Neonatos	Off Label
	Niños	1 - 90 mL/kg/día repartido en 2 dosis. Máx.: 60 mL/día.
	Adultos	15 - 180 mL/día repartido en 1-4 dosis. Máx.: 60 mL/día
Usos/indicación		Estreñimiento, hiperamonemia, encefalopatía hepática.
Vía de administración		VO
Efectos adversos		Ver TABLA 4.5. EFECTOS ADVERSOS. APARATO DIGESTIVO.
Contraindicaciones		Hipersensibilidad, íleo paralítico, impactación fecal, dolor abdominal, apendicitis, perforación intestinal, galactosemia.
Farmacocinética	Vida media	1 - 2 hrs.
	Unión a proteínas plasmáticas	Mínima
	Biodisponibilidad	Mínima
	Metabolismo	GI
	Excreción	Biliar
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.5. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. APARATO DIGESTIVO.
Mecanismo de acción		Incrementa la presión osmótica en el colón, por lo que produce un aumento del contenido de agua de las heces y de su volumen.



Administración	Vía oral	Ver tabla Administración Antiparasitarios-Aparato digestivo
	Vía parenteral	No Aplica
Almacenamiento		Mantener entre 20 - 25 °C. No refrigerar.
Ajuste de dosis	Función renal	No
	Función hepática	No
	Otros	No
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Amoníaco sérico, electrolitos séricos, estado de hidratación, frecuencia deposiciones.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	No
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		No
Observaciones		No

