

Medroxiprogesterona		
Nombre	Genérico	Medroxiprogesterona
	Comercial	Climatrol-HT, Cyclobiol-MP, Cyclofem, Depo-Prodasone, Estranova, Novafac-CC, Novafem, Primaquin-MP, Prodasone, Sayana.
Grupo terapéutico		
Clasificación		Gonadoterapia
Condición de dispensación		RM Ambulatorio - Hospitalizados (Blanca)
Uso restringido		No
Presentación	Vía oral	5 mg Comp.
	Parenteral	No Aplica
	Otra	No Aplica
Dosis	Neonatos	Off Label
	Niños	5 - 10 mg/día repartidos en 1 dosis.
	Adultos	5 - 10 mg/día repartidos en 1 dosis.
Usos/indicación		Menopausia, amenorrea secundaria, esterilidad, síndrome premenstrual, dismenorrea, endometriosis.
Vía de administración		VO
Efectos adversos		Ver TABLA 4.12. EFECTOS ADVERSOS. USO HORMONAL. Diabetes, Gonadoterapia y Mediadores celulares.
Contraindicaciones		Cáncer de mama, tromboflebitis, tromboembolismo, apoplejía, hepatopatía, IH severo, hemorragia vaginal, embarazo, lactancia.
Farmacocinética	Vida media	12 - 17 hrs.
	Unión a proteínas plasmáticas	86 - 90%
	Biodisponibilidad	0,6 - 10%
	Metabolismo	Hepático
	Excreción	Renal
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.12. INTERACCIONES

		MEDICAMENTOSAS. USO HORMONAL. Diabetes, Gonadoterapia y Mediadores celulares.
Mecanismo de acción		Actúa transformando el endometrio proliferativo en endometrio secretorio, puede inhibir la secreción de gonadotrofina hipofisaria, inhibiendo la maduración folicular y la ovulación.
Administración	Vía oral	Administrar con alimentos.
	Vía parenteral	No Aplica
Almacenamiento		Mantener entre 20 - 25 °C.
Ajuste de dosis	Función renal	No
	Función hepática	No
	Otros	No
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Examen físico, Papanicolaou, embarazo, signos y síntomas de tromboembolismo, signos y síntomas de depresión, glicemia, presión sanguínea.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	No
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		No
Observaciones		No