Metolazona

Nombre	**Genérico**	**Metolazona**
	Comercial	**Pavedal**
Grupo terapéutico		
Clasificación		**Diuréticos**
Condición de dispensación		**RM Ambulatorio - Hospitalizado (Blanco)**
Uso restringido		**No**
Presentación	**VÍa oral**	**2,5 mg Comp.**
	Parenteral	**No Aplica**
	Otra	**No Aplica**
Dosis	**Neonatos**	**Off Label**
	Niños	**0,2 - 0,4 mg/kg/día repartidos en 1-2 dosis.**
	Adultos	**2,5 - 20 mg/día repartidos en 1 dosis.**
Usos/indicación		**Edema asociado a IC, enfermedad renal y hepática, HTA leve o moderada.**
Vía de administración		**VO**
Efectos adversos		**Ver TABLA 4.10. EFECTOS ADVERSOS. APARATO CARDIOVASCULAR.**
Contraindicaciones		**Hipersensibilidad a sulfamidas, sulfonilureas o tiazidas.**
Farmacocinética	**Vida media**	**6 - 20 hrs.**
	Unión a proteínas plasmáticas	**90 - 95%**
	Biodisponibilidad	**65 - 40%**
	Metabolismo	**Renal**
	Excreción	**Renal**
Interacciones medicamentosas		**Ver TABLA 3.10. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. APARATO CARDIOVASCULAR.**
Mecanismo de acción		**Actúa inhibiendo un sistema relacionado con el cotransporte de sodio y cloruro, aumentando su excreción (natriuresis)**
Administración	**Vía oral**	**Administrar con alimentos para disminuir malestar GI.**

		Administrar temprano para evitar nocturia.
	Vía parenteral	No Aplica
Almacenamiento		Mantener entre 20 - 25 °C. Proteger de la luz.
Ajuste de dosis	Función renal	No
	Función hepática	No
	Otros	No
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Electrolitos séricos, función renal, presión sanguínea, peso corporal, balance hídrico.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	Si
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		No
Observaciones		No

Hospital de Niños
Dr. Luis Calvo Mackenna
Hospital Autogestionado de Alta Complejidad Fundado en 1942