

Milrinona		
Nombre	Genérico	Milrinona
	Comercial	Corotrope, Milron
Grupo terapéutico		
Clasificación		Estimulantes Cardíacos-Simpaticomiméticos o Adrenérgicos
Condición de dispensación		RM Hospitalizados (Blanca)
Uso restringido		No
Presentación	Vía oral	No Aplica
	Parenteral	10 mg/10 mL Fco. Amp., 10 mg/10 mL Amp.
	Otra	No Aplica
Dosis	Neonatos	0,25 - 0,75 mcg/kg/min.
	Niños	0,25 - 0,75 mcg/kg/min.
	Adultos	0,375 - 0,75 mcg/kg/min. Máx.: 1,13 mg/kg/día.
Usos/indicación		IC aguda
Vía de administración		EV
Efectos adversos		Ver TABLA 4.10. EFECTOS ADVERSOS. APARATO CARDIOVASCULAR.
Contraindicaciones		Hipersensibilidad al p.a.
Farmacocinética	Vida media	1 - 3 hrs.
	Unión a proteínas plasmáticas	0,7
	Biodisponibilidad	No Aplica
	Metabolismo	Hepático
	Excreción	Renal
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.10. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. APARATO CARDIOVASCULAR.
Mecanismo de acción		Actúa aumentando la fuerza contráctil del corazón.
Administración	Vía oral	No Aplica
	Vía parenteral	Ver TABLA 5.10. ADMINISTRACIÓN PARENTERAL. APARATO CARDIOVASCULAR.
Almacenamiento		Mantener entre 20 - 25 °C.
Ajuste de dosis	Función renal	Ver TABLA 1.7. AJUSTE DE DOSIS IR. TRASTORNOS



		SANGUÍNEOS Y APARATO CARDIOVASCULAR.
	Función hepática	No
	Otros	No
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Presión sanguínea, frecuencia cardíaca, parámetros hemodinámicos (CI, SVR, PVR, CVP), ECG, hemograma, recuento plaquetario, electrolitos séricos, enzimas hepáticas, función renal.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	No
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		No
Observaciones		No

