

Morfina		
Nombre	Genérico	Morfina
	Comercial	M-eslon, Morfindol, Oramorph, Samor, Vendal.
Grupo terapéutico		
Clasificación		Analgésicos Narcóticos y Antagonistas
Condición de dispensación		RM Cheque (Verde)
Uso restringido		No
Presentación	Vía oral	2% 10 mL, 2% 60 mL Eco.
	Parenteral	10 mg/1 mL Amp.
	Otra	No Aplica
Dosis	Neonatos	0,15 - 0,3 mg/kg/día repartidos en 3-6 dosis.
	Niños	0,6 - 2,4 mg/kg/día repartidos en 6-12 dosis.
	Adultos	10 - 240 mg/día repartidos en 4-12 dosis.
Usos/indicación		Dolor agudo y crónico, IAM, insuficiencia ventricular izquierda, edema pulmonar, ansiedad previa a cirugía.
Vía de administración		EV, IM, SC, VO.
Efectos adversos		Ver TABLA 4.2. EFECTOS ADVERSOS. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC. Analgésicos - Relajantes músculo esquelético.
Contraindicaciones		Depresión respiratoria, traumatismo craneal, íleo paralítico, EPOC, asma bronquial agudo, trastornos convulsivos, hepatopatía aguda.
Farmacocinética	Vida media	2 - 20 hrs
	Unión a proteínas plasmáticas	20 - 35%
	Biodisponibilidad	0,4
	Metabolismo	Hepático
	Excreción	Renal
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.2. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

		MODIFICADORES FUNCIÓN SNC. Analgésicos - Relajantes músculo esquelético.
Mecanismo de acción		Agonista opiáceo, actúa principalmente a través de los receptores mu-opiáceos.
Administración	Vía oral	Administrar con alimentos.
	Vía parenteral	Ver TABLA 5.2. ADMINISTRACIÓN PARENTERAL. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC. Analgésicos - Relajantes músculo esquelético.
Almacenamiento		Mantener entre 20 - 25 °C. Proteger de la luz.
Ajuste de dosis	Función renal	Ver TABLA 1.1. AJUSTE DE DOSIS IR. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC.
	Función hepática	No
	Otros	No
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Frecuencia respiratoria y cardíaca, saturación de oxígeno, estado mental, presión sanguínea, nivel de sedación, alivio del dolor.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	Si
	Preparado magistral	Si. Solicitud Farmacia Productos Magistrales.
Protocolo de administración		No
Observaciones		No tiene dosis tope. Recomendable asociar con AINEs. Puede generar tolerancia, dependencia física y psicológica.