

Remifentanilo		
Nombre	Genérico	Remifentanilo
	Comercial	Fenburol, Ultiva.
Grupo terapéutico		
Clasificación		Analgésicos Narcóticos y Antagonistas
Condición de dispensación		RM Cheque (Verde)
Uso restringido		No
Presentación	Vía oral	No Aplica
	Parenteral	1 mg/3 mL Amp.
	Otra	No Aplica
Dosis	Neonatos	0,4 - 1 mcg/kg/min.
	Niños	0,05-1,3 mcg/kg/min.
	Adultos	0,5-1 mcg/kg/min.
Usos/indicación		Analgesia en inducción y mantención de anestesia.
Vía de administración		EV
Efectos adversos		Ver TABLA 4.2. EFECTOS ADVERSOS. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC. Analgésicos - Relajantes músculo esquelético.
Contraindicaciones		Hipersensibilidad opioides, evitar administración epidural e intratecal.
Farmacocinética	Vida media	3 - 10 min.
	Unión a proteínas plasmáticas	0,7
	Biodisponibilidad	No Aplica
	Metabolismo	Estearasas tisulares y sanguíneas.
	Excreción	Renal
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.2. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC. Analgésicos - Relajantes músculo esquelético.
Mecanismo de acción		Agonista opiáceo, actúa principalmente a través de los receptores mu-opiáceos en el cerebro, la médula espinal y la



		musculatura lisa.
Administración	Vía oral	No
	Vía parenteral	Ver TABLA 5.2. ADMINISTRACIÓN PARENTERAL. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC. Analgésicos - Relajantes músculo esquelético.
Almacenamiento		Mantener entre 20 - 25 °C. Proteger de la luz.
Ajuste de dosis	Función renal	No
	Función hepática	No
	Otros	Si
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Función respiratoria, presión sanguínea, frecuencia cardíaca, nivel de sedación.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	No
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		No
Observaciones		No