Risperidona

Nombre	**Genérico**	**Risperidona**
	Comercial	**Dagotil, Goval, Lumencian, Radigen, Rimox, Risedin, Rismia, Risperidal, Rispyl, Spax, Spiron.**
Grupo terapéutico		
Clasificación		**Neurolépticos-Antisicóticos**
Condición de dispensación		**RM Ambulatoria - Hospitalizados (Blanca)**
Uso restringido		**No**
Presentación	**Vía oral**	**1 mg Comp.**
	Parenteral	**No Aplica**
	Otra	**No Aplica**
Dosis	**Neonatos**	**Off Label**
	Niños	**0,5 - 4 mg/día repartidos en 2 dosis.**
	Adultos	**2 - 6 mg/día repartidos en 2 dosis.**
Usos/indicación		**Trastornos conducta en retraso mental y en autismo, psicosis, manía, trastorno bipolar.**
Vía de administración		**VO**
Efectos adversos		**Ver TABLA 4.1. EFECTOS ADVERSOS. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC. Anestésicos - Anticonvulsivantes.**
Contraindicaciones		**Hipersensibilidad.**
Farmacocinética	**Vida media**	**3 - 20 hrs**
	Unión a proteínas plasmáticas	**80 - 90%**
	Biodisponibilidad	**70 - 75%**
	Metabolismo	**Hepático**
	Excreción	**Renal y biliar**
Interacciones medicamentosas		**Ver TABLA 3.1. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC. Anestésicos - Anticonvulsivantes.**
Mecanismo de acción		**Antagonista de los receptores serotoninérgicos y**

		dopaminérgicos.
Administración	Vía oral	Se puede administrar indistintamente con o sin alimentos.
	Vía parenteral	No Aplica
Almacenamiento		Mantener entre 20 - 25 °C. Proteger de la luz.
Ajuste de dosis	Función renal	Ver TABLA 1.1. AJUSTE DE DOSIS IR. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC.
	Función hepática	Ver TABLA 2.1. AJUSTE DE DOSIS IH. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC.
	Otros	No
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Presión sanguínea, frecuencia cardíaca, estado mental, crecimiento, talla y peso, enzimas hepáticas, perfil lipídico, glicemia, prolactina sérica.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	Si
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		No
Observaciones		No