

Rituximab		
Nombre	Genérico	Rituximab
	Comercial	Mabthera, Reditux
Grupo terapéutico		
Clasificación		Inmunomoduladores
Condición de dispensación		RM Oncológica (Blanca)
Uso restringido		Si. Formulario Medicamentos de uso Restringido.
Presentación	Vía oral	No Aplica
	Parenteral	100 - 500 mg Fco. Amp.
	Otra	No Aplica
Dosis	Neonatos	Off Label
	Niños	375 mg/m ² /semana repartido en 1-4 dosis. Máx.: 1000 mg/semana.
	Adultos	375 - 500 mg/m ² /semana repartido en 1 dosis.
Usos/indicación		Linfoma no Hodgkin: quimio resistentes, con recidiva o no previamente tratados, artritis reumatoide, anemia hemolítica autoinmune, púrpura trombocitopénica idiopática, lupus eritematoso, Sd. Nefrótico severo.
Vía de administración		EV
Efectos adversos		Ver TABLA 4.14. EFECTOS ADVERSOS. SISTEMA INMUNOLÓGICO Y USO DERMATOLÓGICO.
Contraindicaciones		Hipersensibilidad al p.a. o a proteínas murinas, infecciones graves y activas, enfermedad cardíaca grave no controlada.
Farmacocinética	Vida media	18 - 32 días.
	Unión a proteínas plasmáticas	Información no disponible
	Biodisponibilidad	No Aplica
	Metabolismo	Retículo endotelial
	Excreción	Renal
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.14. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. SISTEMA INMUNOLÓGICO

		Y USO DERMATOLÓGICO.
Mecanismo de acción		Antineoplásico que representa una inmunoglobulina glicosilada. Actúa uniéndose específicamente al antígeno de membrana en linfocitos pre-B y B.
Administración	Vía oral	No Aplica
	Vía parenteral	Ver TABLA 5.14. ADMINISTRACIÓN PARENTERAL. SISTEMA INMUNOLÓGICO.
Almacenamiento		Mantener refrigerado entre 2 - 8 °C. Proteger de la luz.
Ajuste de dosis	Función renal	No
	Función hepática	No
	Otros	No
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Signos vitales, recuento sanguíneo completo, recuento de plaquetas, electrolitos séricos, ácido úrico, función renal y hepática, balance hídrico, monitorización cardíaca, CD20+ periférica, screening para hepatitis B, anticuerpos anti quiméricos y antimurinos.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	No
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		Ver Protocolo de uso. Rituximab
Observaciones		No