



Caspofungina		
Nombre	Genérico	Caspofungina
	Comercial	Cancidas, Casfucid, Caspodyan, Caspovitae, Suvepur.
Grupo terapéutico		
Clasificación		Antifúngicos
Condición de dispensación		RM Hospitalizados (Blanca)
Uso restringido		Si. Formulario Medicamentos de uso Restringido.
Presentación	Vía oral	No Aplica
	Parenteral	70 mg Fco. Amp.
	Otra	No Aplica
Dosis	Neonatos	25 mg/m²/día repartidos en 1 dosis.
	Niños	25 - 70 mg/m²/día repartidos en 1 dosis.
	Adultos	50 - 70 mg/m²/día repartidos en 1 dosis.
Usos/indicación		Aspergilosis en pacientes intolerantes a anfotericina B y/o Itraconazol
Vía de administración		EV
Efectos adversos		Ver TABLA 4.8. EFECTOS ADVERSOS. ANTIINFECCIOSOS. Antifúngicos, Antisépticos urinarios y Otros.
Contraindicaciones		Hipersensibilidad a Caspofungina.
Farmacocinética	Vida media	10 - 50 hrs.
	Unión a proteínas plasmáticas	0,97
	Biodisponibilidad	No Aplica
	Metabolismo	Hepático
	Excreción	Renal y biliar
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.8. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. ANTIINFECCIOSOS. Antifúngicos, Antisépticos urinarios y Otros.
Mecanismo de acción		Inhibición selectiva e irreversible de una enzima

		Indispensable para la integridad de la pared celular fúngica.
Administración	Vía oral	No Aplica
	Vía parenteral	Ver TABLAS DE ESTABILIDAD ANTIMICROBIANOS
Almacenamiento		Mantener refrigerado entre 2 - 8 °C.
Ajuste de dosis	Función renal	No
	Función hepática	Ver TABLA 2.5. AJUSTE DE DOSIS IH. ANTIINFECCIOSOS.
	Otros	Si
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Función hepática, potasio sérico, hemograma, hemoglobina, reacción de anafilaxia.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	No
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		Ver Protocolo de uso. Caspofungina
Observaciones		No