

Cefadroxilo		
Nombre	Genérico	Cefadroxilo
	Comercial	Adrofex, Biogran, Cefamox, Ceforal, Fazotec, Sefadex.
Grupo terapéutico		
Clasificación		Cefalosporinas
Condición de dispensación		RM Ambulatoria - Hospitalizados (Blanca)
Uso restringido		No
Presentación	Vía oral	500 mg Comp., 250 mg/5 mL 60 mL Fco.
	Parenteral	No Aplica
	Otra	No Aplica
Dosis	Neonatos	Off Label
	Niños	30 mg/Kg/día repartido en 2 dosis. Máx.: 2 gr/día.
	Adultos	1 - 2 gr/día repartido en 1-2 dosis. Máx.: 4 gr/día.
Usos/indicación		Faringitis, amigdalitis, otitis media, infecciones de piel, tejidos blandos y tracto urinario.
Vía de administración		VO
Efectos adversos		Ver TABLA 4.6. EFECTOS ADVERSOS. ANTIINFECCIOSOS. Penicilinas, Aminoglicósidos, Macrólidos, Cefalosporinas y Carbapenémicos.
Contraindicaciones		Hipersensibilidad cefalosporinas y penicilinas.
Farmacocinética	Vida media	1 - 2 hrs.
	Unión a proteínas plasmáticas	0,2
	Biodisponibilidad	85 - 99%
	Metabolismo	Hepático
	Excreción	Renal
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.6. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. ANTIINFECCIOSOS. Penicilinas, Aminoglicósidos, Macrólidos, Cefalosporinas y Carbapenémicos.

Mecanismo de acción		Bactericida. Inhibe síntesis y reparación pared bacteriana.
Administración	Vía oral	Se puede administrar indistintamente con o sin alimentos.
	Vía parenteral	No Aplica
Almacenamiento		Mantener entre 20 - 25 °C. Proteger de la humedad.
Ajuste de dosis	Función renal	Ver TABLA 1.5. AJUSTE DE DOSIS IR. Penicilinas, Aminoglicósidos, Macrólidos, Cefalosporinas y Carbapenémicos.
	Función hepática	No
	Otros	No
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Frecuencia de deposiciones.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	Si
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		No
Observaciones		No