

Clomipramina		
Nombre	Genérico	Clomipramina
	Comercial	Anafranil, Ausentron.
Grupo terapéutico		
Clasificación		Antidepresivos
Condición de dispensación		RM Ambulatoria - Hospitalizados (Blanca)
Uso restringido		No
Presentación	Vía oral	25 mg Comp.
	Parenteral	No Aplica
	Otra	No Aplica
Dosis	Neonatos	Off Label
	Niños	3 mg/kg/día repartidos en 1-2 dosis.
	Adultos	25 - 250 mg/día repartidos en 1 dosis.
Usos/indicación		Trastorno obsesivo-compulsivo, enuresis nocturna, depresión, fobias, crisis de ansiedad, trastorno déficit atencional.
Vía de administración		VO
Efectos adversos		Ver TABLA 4.2. EFECTOS ADVERSOS. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC. Analgésicos - Relajantes músculo esquelético.
Contraindicaciones		Pacientes tto. IMAO, glaucoma, patología CV severa, IAM reciente.
Farmacocinética	Vida media	19 - 37 hrs.
	Unión a proteínas plasmáticas	0,97
	Biodisponibilidad	1
	Metabolismo	Hepático
	Excreción	Renal y biliar
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.2. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC. Analgésicos - Relajantes músculo esquelético.



Mecanismo de acción		Inhibición no selectiva de la recaptación de monoaminas (noradrenalina y serotonina), siendo más fuerte su acción sobre recaptación de serotonina.
Administración	Vía oral	Se puede administrar indistintamente con o sin alimentos.
	Vía parenteral	No Aplica
Almacenamiento		Mantener entre 20 - 25 °C.
Ajuste de dosis	Función renal	No
	Función hepática	No
	Otros	No
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Nivel de sedación, hemograma, función cardíaca, presión sanguínea, ECG, enzimas hepáticas.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	Si
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		No
Observaciones		No suspender abruptamente.