

Clonixinato de Lisina		
Nombre	Genérico	Clonixinato de Lisina
	Comercial	Adoplan, Blonax, Celex, Clonalgin, Colmax, Dentagesic, Dolonot, Fultat, Nefersil, Neurocam.
Grupo terapéutico		
Clasificación		Analgésicos y AINES
Condición de dispensación		RM Ambulatoria - Hospitalizados (Blanca)
Uso restringido		No
Presentación	Vía oral	125 mg Comp..
	Parenteral	100 mg/2 mL Amp.
	Otra	No Aplica
Dosis	Neonatos	Off Label
	Niños	Máx. 400 mg/día repartidos en 3-4 dosis.
	Adultos	375 - 1000 mg/día repartidos en 3-4 dosis.
Usos/indicación		Dolor leve o moderado, Inflamación de origen traumático o deportivo.
Vía de administración		EV, IM, VO
Efectos adversos		Ver TABLA 4.3. EFECTOS ADVERSOS. ANALGÉSICOS, ANTIPIRETIICOS Y AINES.
Contraindicaciones		Hipersensibilidad a AINES, hemorragia digestiva, esofágica, cerebral, úlcera péptica, IR e IH grave.
Farmacocinética	Vida media	90 - 105 min.
	Unión a proteínas plasmáticas	0,98
	Biodisponibilidad	56 - 75%
	Metabolismo	Hepático
	Excreción	Renal
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.3. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. ANALGÉSICOS, ANTIPIRETIICOS Y AINES.
Mecanismo de acción		Impide síntesis de prostaglandinas, mediante

		Inhibición competitiva y reversible de ciclooxigenasa.
Administración	Vía oral	Se puede administrar indistintamente con o sin alimentos.
	Vía parenteral	Ver TABLA 5.3. ADMINISTRACIÓN PARENTERAL. ANALGÉSICOS, ANTIPIRETICOS Y AINES.
Almacenamiento		Mantener entre 20 - 25 °C. Proteger de la humedad.
Ajuste de dosis	Función renal	No
	Función hepática	No
	Otros	No
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Hemograma, función hepática y renal.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	Si
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		No
Observaciones		No