

Clopidogrel		
Nombre	Genérico	Clopidogrel
	Comercial	Clotel, Clopivita, Clotrombix, Coplavix, Eurogrel, Fluyet, Iskimil, Piclokare, Plavix.
Grupo terapéutico		
Clasificación		Trombolíticos
Condición de dispensación		RM Ambulatoria - Hospitalizados (Blanca)
Uso restringido		No
Presentación	Vía oral	75 mg Comp.
	Parenteral	No Aplica
	Otra	No Aplica
Dosis	Neonatos	0,2 mg/kg/día repartidos en 1 dosis.
	Niños	0,2 - 1 mg/kg/día repartidos en 1 dosis.
	Adultos	75 mg/día repartidos en 1 dosis.
Usos/indicación		Trombosis, IAM, infarto cerebral, arteriopatía periférica, angina inestable.
Vía de administración		VO
Efectos adversos		Ver TABLA 4.9. EFECTOS ADVERSOS. TRASTORNOS SANGUÍNEOS.
Contraindicaciones		Hipersensibilidad a p.a., IH grave, hemorragia, hemofilia, alteraciones coagulación, úlcera péptica, tratamiento concomitante con anticoagulantes orales.
Farmacocinética	Vida media	6 hrs.
	Unión a proteínas plasmáticas	0,98
	Biodisponibilidad	0,85
	Metabolismo	Hepático
	Excreción	Renal y biliar
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.9. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. TRASTORNOS SANGUÍNEOS.



Mecanismo de acción		Inhíbe selectivamente la unión de ADP a su receptor plaquetario, impidiendo la agregación plaquetaria.
Administración	Vía oral	Se puede administrar indistintamente con o sin alimentos.
	Vía parenteral	No Aplica
Almacenamiento		Mantener entre 20 - 25 °C.
Ajuste de dosis	Función renal	No
	Función hepática	No
	Otros	Si
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Signos de hemorragia, hemoglobina, hematocrito, inhibición agregación plaquetaria.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	Si
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		No
Observaciones		No