

Cloranfenicol		
Nombre	Genérico	Cloranfenicol
	Comercial	Clorampast, Gemitin, Kaph, Sintoftona, Otandrol.
Grupo terapéutico		
Clasificación		Otros antiinfecciosos
Condición de dispensación		RM Ambulatorio - Hospitalizados (Blanca)
Uso restringido		No
Presentación	Vía oral	No Aplica
	Parenteral	1 gr Fco. Amp., 0,5% 10 mL Fco. Amp.
	Otra	1% 3,5 gr Ungüento
Dosis	Neonatos	25 - 50 mg/kg/día repartidos en 1-2 dosis.
	Niños	50 - 100 mg/kg/día repartidos en 4 dosis. Máx.: 4 g/día.
	Adultos	50 - 100 mg/kg/día repartidos en 4 dosis. Máx.: 4 g/día.
Usos/indicación		Absceso cerebral, actinomicosis, artritis infecciosa, sífilis, brucelosis, celulitis, epiglotitis, fiebre recurrente, tifoidea y paratifoidea, infecciones digestivas, meningitis, otitis media, peste, neumonía, sinusitis.
Vía de administración		EV
Efectos adversos		Ver TABLA 4.8. EFECTOS ADVERSOS. ANTIINFECCIOSOS. Antifúngicos, Antisépticos urinarios y Otros.
Contraindicaciones		Hipersensibilidad cloranfenicol, porfiria.
Farmacocinética	Vida media	3 - 24 hrs.
	Unión a proteínas plasmáticas	0,6
	Biodisponibilidad	No Aplica
	Metabolismo	Hepático, renal y pulmonar
	Excreción	Renal
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.8. INTERACCIONES

		MEDICAMENTOSAS. ANTIINFECCIOSOS. Antifúngicos, Antisépticos urinarios y Otros.
Mecanismo de acción		Interfiere en el proceso de síntesis proteica bacteriana, al unirse reversiblemente a la subunidad 50S ribosomal.
Administración	Vía oral	No Aplica
	Vía parenteral	Ver TABLA 5.8. ADMINISTRACIÓN PARENTERAL. ANTIINFECCIOSOS. Antifúngicos y Otros.
Almacenamiento		Mantener entre 20 - 25 °C.
Ajuste de dosis	Función renal	No
	Función hepática	No
	Otros	Si
Monitorización	Nivel plasmático	Si
	Examen control	Hemograma, recuento plaquetario, hierro sérico, función renal y hepática.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	No
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		No
Observaciones		No