

Clorhexidina		
Nombre	Genérico	Clorhexidina
	Comercial	Antisep, Bucoseptil, Chloraprep, Chlorohex, Dentilim, Dichlorexan, Elogerme, Endogel, Instillagel, Kenoxyl, Oralgene, Pancrit, Perio-Aid, Soluprep
Grupo terapéutico		
Clasificación		Antiséptico externo
Condición de dispensación		RM Hospitalizados (Blanca)
Uso restringido		No
Presentación	Vía oral	No Aplica
	Parenteral	No Aplica
	Otra	2% 500 - 1000 mL, 0,5% 150 mL, 0,12% 100 mL Fco.
Dosis	Neonatos	Off Label
	Niños	20 - 45 mL/día repartidos en 2-3 dosis.
	Adultos	20 - 45 mL/día repartidos en 2-3 dosis.
Usos/indicación		Periodontitis, prevención caries dental, descontaminación orofaríngea, higiene manos personal de salud, limpiador general de piel, limpieza sitio del catéter.
Vía de administración		Tópica, Bucal
Efectos adversos		Ver TABLA 4.14. EFECTOS ADVERSOS. SISTEMA INMUNOLÓGICO Y USO DERMATOLÓGICO.
Contraindicaciones		Hipersensibilidad al p.a.
Farmacocinética	Vida media	Información no disponible
	Unión a proteínas plasmáticas	0,87
	Biodisponibilidad	No Aplica
	Metabolismo	Información no disponible
	Excreción	Biliar
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.14. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. SISTEMA INMUNOLÓGICO Y USO DERMATOLÓGICO.



Mecanismo de acción		Antiséptico, fungistático y esporostático con acción sobre Gram positivos.
Administración	Vía oral	No Aplica
	Vía parenteral	No Aplica
Almacenamiento		Mantener entre 20 - 25 °C.
Ajuste de dosis	Función renal	No
	Función hepática	No
	Otros	No
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Descoloración dental, mejora en inflamación gingival, monitorización de enrojecimiento e irritación de la piel.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	Si
	Preparado magistral	Si. Solicitud Farmacia Preparados Magistrales.
Protocolo de administración		No
Observaciones		No