

Clorpromazina		
Nombre	Genérico	Clorpromazina
	Comercial	Largactil
Grupo terapéutico		
Clasificación		Neurolépticos-Antisicóticos
Condición de dispensación		RM Ambulatoria - Hospitalizados (Blanca)
Uso restringido		No
Presentación	Vía oral	25 mg Comp..
	Parenteral	25 mg/2 mL Amp.
	Otra	No Aplica
Dosis	Neonatos	2,2 mg/kg/día repartidos en 4 dosis.
	Niños	VO: 2,2 mg/kg/día repartidos en 4-6 dosis; EV, IM: 40 - 75 mg/día. Máx.: 500 mg/día
	Adultos	VO: 30 - 800 mg/día repartidos en 2-4 dosis; EV, IM: 200 - 800 mg/día
Usos/indicación		Psicosis, crisis maníacas, esquizofrenia, agitación previa cirugía, náuseas, vómitos, hiperactividad, coadyuvante en tétanos.
Vía de administración		VO, EV, IM
Efectos adversos		Ver TABLA 4.1. EFECTOS ADVERSOS. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC. Anestésicos - Anticonvulsivantes.
Contraindicaciones		Enf. Cardiovascular severa, hipersensibilidad fenotiazinas, depresión SNC y medular, coma, feocromocitoma.
Farmacocinética	Vida media	8 - 30 hrs
	Unión a proteínas plasmáticas	92 - 97%
	Biodisponibilidad	32 - 50%
	Metabolismo	Hepático
	Excreción	Renal
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.1. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. MODIFICADORES

		FUNCIÓN SNC. Anestésicos - Anticonvulsivantes.
Mecanismo de acción		Bloquea, a nivel cerebral, los receptores dopaminérgicos mesolímbicos postsinápticos.
Administración	Vía oral	Administrar con agua, comida o leche para disminuir las molestias GI; puede generarse un precipitado café al mezclarlo con líquidos que contengan cafeína.
	Vía parenteral	Ver TABLA 5.1. ADMINISTRACIÓN PARENTERAL. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC. Anestésicos - Anticonvulsivantes.
Almacenamiento		Mantener entre 20 - 25 °C. Proteger de la luz.
Ajuste de dosis	Función renal	No
	Función hepática	No
	Otros	No
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Función cognitiva, ECG, presión arterial, glicemia, perfil lipídico.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	No
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		No
Observaciones		No