

Colestiramina		
Nombre	Genérico	Colestiramina
	Comercial	Resincolestiramina.
Grupo terapéutico		
Clasificación		Enzimas digestivas
Condición de dispensación		RM Ambulatoria - Hospitalizados (Blanca)
Uso restringido		No
Presentación	Vía oral	4 gr. Sobre
	Parenteral	No Aplica
	Otra	No Aplica
Dosis	Neonatos	Off Label
	Niños	240 mg/kg/día repartidos en 3 dosis. Máx.: 8 gr/día.
	Adultos	6 - 16 gr/día repartidos en 3-4 dosis. Máx.: 32 gr/día.
Usos/indicación		Hipercolesterolemia, dislipidemias.
Vía de administración		VO
Efectos adversos		Ver TABLA 4.5. EFECTOS ADVERSOS. APARATO DIGESTIVO.
Contraindicaciones		Alergia a colestiramina, obstrucción biliar.
Farmacocinética	Vida media	No Aplica
	Unión a proteínas plasmáticas	No Aplica
	Biodisponibilidad	No Aplica
	Metabolismo	No Aplica
	Excreción	Biliar
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.5. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. APARATO DIGESTIVO.
Mecanismo de acción		Actúa formando complejos iónicos inabsorbibles con los ácidos biliares, excretados con las heces. Así, una parte de los ácidos biliares producidos por el hígado son eliminados, y se genera un gasto del colesterol circulante en sangre.
Administración	Vía oral	Ver tabla Administración Antiparasitarios-Aparato



		digestivo
	Vía parenteral	No Aplica
Almacenamiento		Mantener entre 20 - 25 °C.
Ajuste de dosis	Función renal	No
	Función hepática	No
	Otros	No
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Perfil lipídico, crecimiento, frecuencia de deposiciones.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	No
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		No
Observaciones		No

