

Dantroleno		
Nombre	Genérico	Dantroleno
	Comercial	Dantrium
Grupo terapéutico		
Clasificación		Relajante músculo esquelético
Condición de dispensación		RM Hospitalizados (Blanca)
Uso restringido		No
Presentación	Vía oral	No Aplica
	Parenteral	20 mg Fco. Amp.
	Otra	No Aplica
Dosis	Neonatos	Off Label
	Niños	0,5 - 6 mg/kg/día repartidos en 1-3 dosis.
	Adultos	25 - 300 mg/día repartidos en 1-3 dosis.
Usos/indicación		Espasticidad muscular en lesión médula espinal, hemorragia y parálisis cerebral, hipertermia maligna, síndrome neuroléptico maligno.
Vía de administración		EV
Efectos adversos		Ver TABLA 4.2. EFECTOS ADVERSOS. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC. Analgésicos - Relajantes músculo esquelético.
Contraindicaciones		Cirrosis, hepatitis, embarazo, lactancia.
Farmacocinética	Vida media	10 - 20 hrs.
	Unión a proteínas plasmáticas	80 - 90%
	Biodisponibilidad	No Aplica
	Metabolismo	Hepático
	Excreción	Biliar
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.2. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC. Analgésicos - Relajantes músculo esquelético.
Mecanismo de acción		Bloquea la liberación de calcio

		del retículo sarcoplásmico, disminución contracción del músculo esquelético.
Administración	Vía oral	No Aplica
	Vía parenteral	Ver TABLA 5.2. ADMINISTRACIÓN PARENTERAL. MODIFICADORES FUNCIÓN SNC. Analgésicos - Relajantes músculo esquelético.
Almacenamiento		Mantener refrigerado entre 2 - 8 °C. Proteger de la luz. No congelar.
Ajuste de dosis	Función renal	No
	Función hepática	No
	Otros	No
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Función hepática, cardíaca y respiratoria, presión sanguínea, signos vitales, temperatura, electrolitos.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	No
	Preparado magistral	No
Protocolo de administración		No
Observaciones		No mezclar con sales de calcio.