

Dexametasona		
Nombre	Genérico	Dexametasona
	Comercial	Alcon Cilo-Dex, Baycuten, Ciprodex, Cortyk, Dexacort-C, Dexagin, Etacortilen, Isopto Maxidex, Kladjos, Ozurdex, Poenbiotic, Poentobral-Plus, Septodont, sophixin, Telugren, Toradex, Tobragan-D, Tobral-D, Todexona, Trazidex, Tribesona, Xolof-D.
Grupo terapéutico		
Clasificación		Modificadores función corteza suprarrenal
Condición de dispensación		RM Ambulatorio - Hospitalizado (Blanca)
Uso restringido		No
Presentación	Vía oral	0,5 - 4 mg Comp.
	Parenteral	4 mg/1 mL Amp., 1 mg/mL 5mL Fco. Amp.
	Otra	No Aplica
Dosis	Neonatos	0,15 - 1,5 mg/kg/día repartidos en 2-3 dosis.
	Niños	0,03 - 2 mg/kg/día repartidos en 1-4 dosis. Máx.: 40 mg/día
	Adultos	0,4 - 16 mg/día repartidos en 1-4 dosis.
Usos/indicación		Enfermedad de Addison, deficiencia corticosuprarrenal, hiperplasia suprarrenal congénita, tiroiditis, hipercalcemia, síncope, edema, trasplante, distres respiratorio, artritis psoriasica, artritis reumatoide, lupus eritematoso, eritema multiforme severo, rinitis alérgica, asma, reacciones de hipersensibilidad, enfisema pulmonar, neumonía por aspiración, enfermedad de Crohn, leucemia, linfoma, angioedema, meningitis



		bacteriana aguda.
Vía de administración		EV, IM, VO
Efectos adversos		Ver TABLA 4.11. EFECTOS ADVERSOS. USO HORMONAL. Glandula Tiroides, Hipófisis y Corteza suprarrenal.
Contraindicaciones		Hipersensibilidad a componentes de la formulación, micosis sistémicas, coadministración de vacunas vivas o atenuadas.
Farmacocinética	Vida media	1 - 9 hrs.
	Unión a proteínas plasmáticas	0,7
	Biodisponibilidad	50 - 80%
	Metabolismo	Hepático
	Excreción	Renal y biliar
Interacciones medicamentosas		Ver TABLA 3.11. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS. USO HORMONAL. Glandula Tiroides, Hipófisis y Corteza suprarrenal.
Mecanismo de acción		Actúa estimulando o reprimiendo la transcripción génica de ARNm específicos que codifican la síntesis de determinadas proteínas en los órganos blanco. Inhibe las manifestaciones de inflamación, disminuyen la respuesta inmunológica.
Administración	Vía oral	Administrar con alimentos o leche para disminuir malestar GI.
	Vía parenteral	Ver TABLA 5.11. ADMINISTRACIÓN PARENTERAL. USO HORMONAL. Glandula Tiroides, Hipófisis y Corteza suprarrenal.
Almacenamiento		Mantener entre 20 - 25 °C. Proteger de la luz y humedad.
Ajuste de dosis	Función renal	No
	Función hepática	No



	Otros	No
Monitorización	Nivel plasmático	No
	Examen control	Hemoglobina, presión sanguínea, potasio sérico, glicemia, peso y altura en niños.
Fraccionamiento	Solución extemporánea	Si
	Preparado magistral	Si. Solicitud Farmacia Preparados Magistrales.
Protocolo de administración		No
Observaciones		No

